

ტიპობრივი ტესტები:

1. რომელი ინსტრუმენტი განკუთვნილი ქვედა მოლარების ამოსაღებად?
 - ა) პირდაპირი ელევატორი;
 - ბ) მამა წვეტიანი ნისკარტებით;
 - გ) მამა შეერთებული ნისკარტებით;
 - დ) პირდაპირი მამა;

2. რომელი ინსტრუმენტი გამოიყენება ქვედა ყბის ფესვების ამოსაღებად?
 - ა) ხიშტისებური მამა;
 - ბ) პირდაპირი მამა;
 - *გ) ყვავის ნისკარტისებური მამა დახურული ტუჩებით;
 - დ) S-ისებური მამა.

3. კბილის ამოღების მომენტში ადგილობრივი ხასიათის გართულებას წარმოადგენს:
 - ა) ანაფილაქსიური შოკი;
 - *ბ) ზედა ყბის წიაღის ფსკერის პერფორაცია;
 - გ) კოლაფსი;
 - დ) ალვეოლიტი.

4. რა ვადებში ხდება კბილბუდის ეპითელიზაცია ?
 - *ა) 7-10 დღე;
 - ბ) 9 კვირა;
 - გ) 4-6 თვე;
 - დ) 24-36 დღე.

5. ადგილობრივი ანესთეზიის უშუალო ზოგად გართულებას წარმოადგენს:
 - *ა) გულის წასვლა;
 - ბ) ჰემატომა;
 - გ) კონტრაქტურა;
 - დ) ზედა ყბის წიაღის გახსნა.