

ტიპიური საგამოცდო ტესტები

ფთიზიატრიაში დიპლომირებული მედიკოსის ქართულენოვანი პროგრამის სტუდენტებისთვის

ტუბერკულოზური მიკობაქტერიის გარსი არ მოიცავს შემდეგ შრეს:

1. მუკოლიკ აციდური
2. არაბინოგალაქტანური
3. იზოგლუტამინური
4. პეპტიდოგლიკანური

მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის კონტაქტებს პრევენციისთვის ენიშნებათ რეჟიმი:

1. "6H"
2. "6Lfx"
3. "3HP"
4. "6HRZE"

აქტიური ტუბერკულოზი ორგანიზმში შეიძლება ჩამოყალიბდეს:

1. ენდოგენური რეაქტივაციის გზით
2. ეგზოგენური რეაქტივაციის გზით
3. ენდოგენური სუპერინფექციის გზით
4. ყველა ჩამოთვლილი გზით

ბედაქილინი ახდენს:

1. მუკოლიკაციდური შრის ლიზის
2. ატფ-ის სინთეზის ინჰიბირებას
3. დნმ-ის სინთეზის ინჰიბირებას
4. რიბოსომული პროტეინების სინთეზის ინჰიბირებას

"Gene Xpert" ტესტი იძლევა შემდეგ შედეგს:

1. მგბ (+) ან მგბ (-)

2. კულტურა (+) ან კულტურა (-)
3. "MTB" (+) ან "MTB" (-)
4. "Fq" სენსიტიური ან "Fq" რეზისტენტული