

ტიპობრივი ტესტები პათოფიზიოლოგიაში IV სემესტრის № 14 მოდული „გარემო და ჯანმრთელობა“

//// თამბაქოს მოხმარებით გამოწვეული ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადებაა:

/// შემაერთებელქსოვილოვანი დაავადებები

// ათეროსკლეროზი და მისი მნიშვნელოვანი გართულება - მიოკარდიუმის ინფარქტი

///შაქრიანი დიაბეტი

/// შარდგამომყოფი სისტემის დაავადებები

//// ალკოჰოლის ზემოქმედებამ ნაწლავის მიკროფლორაზე შესაძლოა გამოიწვიოს:

/// ბაქტერიებიდან ენდოტოქსინის გამოყოფის დათრგუნვა

/// მოცირკულირე მაკროფაგებიდან ციტოკინების გამოყოფის დაქვეითება

/// ნაწლავებში ბილირუბინის გარდაქმნის დარღვევა

/// ბაქტერიებიდან ენდოტოქსინის გამოყოფის გაძლიერება

//// ტვინის დაჟეჟვის (contusio cerebri) კლინიკური სიმპტომები უკავშირდება:

/// ქალასშიდა წნევის გაზრდას

/// სახის ნერვის ცენტრის აგზნებას

/// ტვინის დაზიანებული ნაწილის ლოკალიზაციას

/// სამწვერა ნერვის დაზიანებას

//// სითბური დარტყმის დროს ვითარდება:

/// გულის მუშაობის დათრგუნვა მასზე სიმპათიკური გავლენის გაძლიერების გამო

/// პოლიურია

/// ოლიგურია

/// სისხლის სიბლანტის დაქვეითება

//// კინეტოზის პათოგენეზში მონაწილეობს:

/// პროპრიო- და მექანორეცეპტორების აგზნება

/// ტაქიკარდია

///თერმორეგულაციის ცენტრის აგზნება

/// კუჭის სეკრეციის გაძლიერება